

# Selvmord etter kjønn, alder og døds måte - *Alle aldersgrupper, Antall dødsfall*

Dødsår			2009	2010	2011	2012	2013
Dødsårsak	Kjønn	Alder					
Alle årsaker	Alle	Alle aldersgrupper	578	550	601	516	554
		7-14 år	4	1	7	2	1
		15-24 år	71	74	78	67	64
		25-34 år	96	86	97	78	80
		35-44 år	110	95	112	99	105
		45-54 år	104	105	123	109	124
		55-64 år	103	92	92	83	90
		65-74 år	47	56	50	31	54
		75-84 år	29	29	29	32	29
		Over 85 år	14	12	13	15	7
	Ukjent	-	-	-	-	-	
	Mann	Alle aldersgrupper	421	386	437	370	378
		7-14 år	1	1	3	1	1
		15-24 år	53	61	58	46	44
		25-34 år	65	62	74	61	56
		35-44 år	85	70	82	76	75
		45-54 år	70	62	81	72	79
		55-64 år	76	56	69	59	55
		65-74 år	35	43	34	22	37
		75-84 år	26	23	24	22	25
		Over 85 år	10	8	12	11	6
	Ukjent	-	-	-	-	-	
	Kvinne	Alle aldersgrupper	157	164	164	146	176
		7-14 år	3	-	4	1	-
		15-24 år	18	13	20	21	20
		25-34 år	31	24	23	17	24
		35-44 år	25	25	30	23	30
		45-54 år	34	43	42	37	45
		55-64 år	27	36	23	24	35
		65-74 år	12	13	16	9	17
75-84 år		3	6	5	10	4	
Over 85 år		4	4	1	4	1	
Ukjent	-	-	-	-	-		

# Selv mord etter kjønn, alder og døds måte - *Alle aldersgrupper,* *Antall dødsfall*

## Description

Dødsfall som følge av selvmord. Antall døde per år.

Kategorier: Alle årsaker, forgiftning (X60-X66), hengning og kvelning (X70), drukning (X71), skyting og eksplosive stoffer (X72-X75), skjærende eller stikkende redskaper (X78), sprang fra høyt sted (X80), annen eller uoppgitt måte (X67-X69, X76-X77, X79, X81-X84) ICD-10 kode i parentes.

Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Dødsårsaksregisteret skal fra 15.6.2012 registrere dødsfall hos personer som døde under midlertidig opphold i Norge. Av statistiske grunner holdes disse utenfor statistikkbanken.

## Statistisk analyse

Følgende utgaver av ICD-klassifikasjonen er brukt: 1969-1985: ICD-8, 1986-1995: ICD-9, og fra og med 1996: ICD-10.

Dødsårsakskodene er omkodet fra ICD-8 (1969-1985), ICD-9 (1986-1995) og ICD-10 (fra og med 1996) til koder basert på europeisk kortliste. Tall fra før 1996 kan avvike fra tidligere publiserte tall pga revisjon av klassifikasjonssystemet, og blir ikke vist i statistikkbanken. Tall fra før 1989 kan i tillegg avvike noe fra tidligere publiserte tall pga ajourføring av eldre datafiler.

Noen mindre definisjonsendringer ble innført i forbindelse med publisering av 2011 dødsårsaksstatistikken:

Selv mord: senvirkning av selvmordsforsøk (ICD-10: Y87.0) er nå inkludert blant dødsfall som omfatter selvmord og villet egenskade. Definisjonsendring gjelder for alle årganger.

## Source

Dødsårsaksregisteret ved Nasjonalt folkehelseinstitutt

## Time periods

Menn, kvinner.

## Aldersgrupper

Alt 1.: Alder ved død: Alle aldre, Under 1 år, 1-6 år, 7-14 år, 15-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, 65-74 år, 75-84 år, 85 år og eldre, ukjent

# Selvmord etter kjønn, alder og døds måte - *Alle aldersgrupper,* *Antall dødsfall*

Alt 2.: Alder ved død: Alle aldre, 0-9 år, 10-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, 70-79 år, 80-89 år, 90 år og eldre

## Geographical level

Landet

## Age groups

Følgende utgaver av ICD-klassifikasjonen er brukt: 1969-1985: ICD-8, 1986-1995: ICD-9, og fra og med 1996: ICD-10. Dødsårsakskodene er omkodet fra ICD-8 (1969-1985), ICD-9 (1986-1995) og ICD-10 (fra og med 1996) til koder basert på europeisk kortliste. Tall fra før 1996 kan avvike fra tidligere publiserte tall pga revisjon av klassifikasjonssystemet. Tall fra før 1989 kan i tillegg avvike noe fra tidligere publiserte tall pga ajourføring av eldre datafiler. Voldsomme dødsfall (V01-Y89) inkluderer transportulykker, fallulykker, forgiftningsulykker, selvmord og drap. Før 2003 ble alle akutte forgiftningsdødsfall hos misbrukere kodet med ICD-10-kode F10-19 med fjerdesiffer 0 (kapittel for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser) . Forgiftningsdødsfall der den avdøde ikke var kjent som misbruker, ble koda som ulykke med ICD-kode X40-X49. Etter anbefaling fra WHO er alle akutte forgiftningsdødsfall flyttet til kapitlet for ulykker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) fra og med årgang 2003. Denne endringen gir betydelige utslag i statistikken, det vil si flere forgiftningsdødsfall i kapitlet for ulykker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) og færre forgiftningsdødsfall i kapitlet for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser (kapittel V, ICD-10-kode F10-F19). Veirafikkulykker inkluderer følgende ICD-10 koder (4.siffer i parentes): V01-V06(.1), V81-V82(.1), V09(.2-3), V89(.2-3), V10-V18(.4-5,9), V20-V28(.4-5,9), V19(.4-6,8-9), V29(.4-6,8-9), V39(.4-6,8-9), V49(.4-6,8-9), V59(.4-6,8-9), V69(.4-6,8-9), V79(.4-6,8-9), V30-V38(.5-7,9), V40-V48(.5-7,9), V50-V58(.5-7,9), V60-V68(.5-7,9), V70-V78(.5-7,9), V83-V86(.0-3), V87(.0-9) Lårhalsbrudd ble fra årgang 2005 kodet som uspesifisert ulykke, fraktur ICD-10 X590 dersom ikke annet er angitt på dødsmeldingen. De ble tidligere kodet som uspesifisert fall, ICD-10 W19. Dette har medført en stigning i antall uspesiferte ulykker.